


MÉMOTIQUE

1.


Le genre **DERMACENTOR**



Distribution de *Dermacentor marginatus* (zones rouges).
Crédit ECDC & EFSA

Taille
3 - 6,5mm

Signe distinctif
pigmentation
blanchâtre
(émail) sur la face-
dorsale



Présent dans toute la France,
dans les forêts, prairies, landes, broussailles...



Les adultes sont observés plus tôt que les autres espèces de tiques, **notamment en février-mars** mais leur présence s'étale sur l'automne et le printemps.


Il existe 2 espèces de ce genre en Europe
Dermacentor marginatus
& *D. reticulatus*.

La distinction entre les 2 espèces nécessite un examen sous loupe binoculaire.

Biologie

La **durée moyenne du cycle est d'environ 1 à 2 ans**. Elle varie en fonction des espèces et des conditions environnementales.

Tiques dont les stades immatures (**larves et nymphes**) se gorgent préférentiellement sur les petits mammifères, dans leurs terriers.



Les **adultes** s'attaquent aux mammifères de taille moyenne à grande (sangliers, cerfs, chevreuils, vaches, moutons, chèvres, chevaux, chiens...) et **occasionnellement à l'homme** (notamment au niveau de la tête et du cou).



CHEZ L'HOMME

Importance
médico-vétérinaire



CHEZ L'ANIMAL

transmission de	genre	responsable de
Bactéries	<i>Rickettsia</i>	Syndrome TIBOLA (tick-borne lymphadenopathy)

transmission de	genre	responsable de
Bactéries	<i>Anaplasma</i>	Anaplasmose (petits-ruminants)
Protozoaires	<i>Babesia / Theileria</i>	Piroplasmoses (chiens, chevaux)